

Modélisation de l'évolution des populations, appliquée à l'épidémiologie

Martin LEHOUX Paul CACHEUX

1^{er} juin 2018

Table des matières

1	Abstract	2
2	Introduction	3
3	Revue de littérature	4
4	Modèle mathématique de la dynamique d'un réservoir	5
4.1	Hypothèses	5
4.2	Détermination des paramètres	6
4.3	Premier modèle d'évolution : SIR	7
4.4	Second modèle d'évolution : SIER	8
5	Modèle mathématique d'interaction entre plusieurs populations	9

1 Abstract

Research on disease spreading is likely to lead to a drastic improvement in human health care with any find. We tried to develop a model of disease spread that could help governments to make the best decisions (in term of vaccination for instance) in case of epidemic, and to provide a digital tool to use this model. After we both developped this model, Paul focused on coding the digital tool using Matlab, while Martin extracted data needed by the model from known statistics of diseases. We used different models already developped, such as SIR (and SIRS) models, and automated systems with variable dead-time, to build our own model. This model describe disease dynamics inside a population and between different populations. Our results lead to understand how a small difference in vaccination can have a huge impact on the survival of a population. The tool provided makes it possible to simulate different vaccination policy to predict the population evolution.

Keywords : Modeling ; Numerical simulation ; Disease spreading ; Evolution ; Demography ;

2 Introduction

Dans cet article, nous nous intéressons à l'analyse et la modélisation de la dynamique des populations. Nous nous sommes recentrés sur l'étude de la propagation des virus au sein de populations humaines, car l'impact des études sur la santé humaine peut se révéler très précieux.

Nous avons décidé de séparer notre travail en deux parties, l'un modélisant la propagation d'un virus au sein d'une population précise, l'autre permettant de simuler les interactions entre ces différentes populations. Notre objectif est donc de fournir à la fois un modèle de dynamique et un outil numérique pour exploiter ce modèle.

Paul s'est principalement occupé de l'implémentation algorithmique sur Matlab des modèles que nous avons élaborés, tandis que Martin a extrait les données des statistiques sur les virus pour alimenter le modèle. Nous avons conçu notre modèle en respectant certaines hypothèses, nécessaires lors de la modélisation de dynamiques touchant aux êtres vivants, bien trop complexes dans leur entièreté.

L'article se décompose en deux parties, l'une traitant de la modélisation de la dynamique d'un "réservoir" de population, à partir du modèle SIR. La seconde extrapole ces résultats en mettant en concurrence différentes populations.

3 Revue de littérature

4 Modèle mathématique de la dynamique d'un réservoir

On s'intéresse à l'évolution d'une population sans échanges avec l'extérieur. Cette population est composée de catégories, que nous expliciterons dans la suite. On peut représenter les échanges entre différentes catégories dans cette population, par un graphe stochastique, dont les différents coefficients peuvent dépendre des catégories elles mêmes. On tombe ici sur une première problématique : notre système n'est alors pas linéaire, et on ne peut le représenter par une chaîne de Markov. Deux options se présentent alors à nous :

- Pour Matlab, il est nécessaire de linéariser le système autour d'un point d'équilibre afin d'effectuer des analyses de stabilité.
- Pour Python, on peut tout simplement recalculer la matrice de transition à chaque pas de calcul.

4.1 Hypothèses

Pour notre premier modèle, nous avons besoin des hypothèses suivantes :

- Homogénéité : les individus de chaque catégorie se mélangent parfaitement dans le milieu.
- Distribution des ages : les individus ne sont pas différents selon leur age.
- Mis à part l'incubation, tous les phénomènes suivent des lois géométriques.
- Les enfants des malades et des immunisés sont sains.

4.2 Détermination des paramètres

Pour être le plus précis possible, le modèle a besoin de nombreux paramètres.

Paramètre	Description	Value	Normalized value (per day)
$birth$	Birth rate	1.85% per year	5.0×10^{-5}
$death_{nat}$	Natural death rate	0.78% per year	2.1×10^{-5}
T	Infection duration	24 days	24
$death_{ill}$	Disease death rate	3%	1.3×10^{-3}
R	Recovery rate	97%	0.97
θ	Incubation duration	12 days	12
p	Transmission risk	60[1]%	0.6
γ	Contact rate	25 per day	25
$vaccin_{duration}$	Efficiency duration of vaccin	10 years	3650
$loss$	Loss of immunity		2.7×10^{-4}

TABLE 1 – Paramètres du modèle et valeurs moyennes, exemple de la smallpox

Voici comment sont déterminés les paramètres ($||x||$ correspond à la valeur normalisée du paramètre x) :

— $birth$, $death_{nat}$ sont déterminés à partir de leur valeur annuelle :

$$||x|| = (1 + x)^{\frac{1}{365}} - 1$$

— $death_{ill}$ est calculé à partir de la durée d'infection ainsi que du taux de mortalité de la maladie :

$$||death_{ill}|| = \frac{death_{ill}}{T}$$

— R est calculé à partir de la durée d'infection :

$$R = \frac{1 - death_{ill}}{T}$$

— $loss$ est calculé à partir de la durée d'efficacité du vaccin :

$$loss = \frac{1}{vaccin_{duration}}$$

Variable	Description
r_k	Removed (immune) population
i_k	Infected population
s_k	Susceptible population
$e_{\theta,k}$	People with θ time step incubation
\dots	\dots
$e_{1,k}$	People with 1 time step incubation

TABLE 2 – Vecteur d'état

4.3 Premier modèle d'évolution : SIR

Voici les différentes équations régissant l'évolution pas à pas du système (tout d'abord sans l'incubation) :

$$\begin{aligned}
- s_{k+1} &= (-death_{nat} - p \cdot \frac{i_k}{s_k + i_k + r_k}) s_k + loss \cdot r_k + birth(s_k + i_k + r_k) \\
- i_{k+1} &= p \cdot \frac{i_k}{s_k + i_k + r_k} \cdot s_k + (-death_{ill} - R) i_k \\
- r_{k+1} &= vacc_{rate} \cdot s_k + R \cdot i_k + (1 - death_{nat} - loss) r_k
\end{aligned}$$

Le terme $s_k \cdot (1 - \frac{\gamma \cdot p}{N})^I$ représente la transmission du virus. Voici comment obtenir cette formule :

- Un individu infecté effectue γ contacts par jour, donc seule une proportion p est susceptible de transmettre la maladie.
- Parmi ces contacts, seuls $\frac{S}{N}$ atteignent des personnes saines. On a donc $\frac{\gamma \cdot p \cdot S}{N}$ transmissions par individu infecté.
- Soit X un individu sain, il a donc $P = \frac{S - \frac{\gamma \cdot p \cdot S}{N}}{S} = 1 - \frac{\gamma \cdot p}{N}$ chances d'être contaminé par un individu Y infecté.
- Si X veut rester sain face aux i_k infectés, il n'a donc plus que P^{i_k} chances de le rester.
- Enfin, on a donc $S \cdot P^{i_k}$ personnes saines qui sont infectées à chaque pas.

4.4 Second modèle d'évolution : SIER

On peut ensuite introduire dans notre modèle le phénomène d'incubation. Pour cela, on doit utiliser des variables stockant les personnes à différents stades de l'incubation, comme vu à la figure 2. Cela change légèrement les équations :

- $s_{k+1} = (-death_{nat} - p \cdot \frac{i_k}{s_k + i_k + r_k})s_k + loss.r_k + birth(s_k + i_k + r_k)$
- $e_{1,k+1} = p \cdot \frac{i_k}{s_k + i_k + r_k} \cdot s_k$
- $\forall l \in [2, \theta], e_{l,k+1} = e_{l-1,k}$
- $i_{k+1} = e_{\theta,k} + (-death_{ill} - R)i_k$
- $r_{k+1} = vacc_{rate} \cdot s_k + R \cdot i_k + (1 - death_{nat} - loss)r_k$

5 Modèle mathématique d'interaction entre plusieurs populations

Après avoir étudié le fonctionnement d'un réservoir en tant que système fermé, on peut s'intéresser à l'interaction entre plusieurs réservoirs. Pour ne pas perdre les résultats de l'étude précédente, on peut scinder le nouveau fonctionnement à l'aide d'un schéma-bloc.




FIGURE 1 – Modélisation par schéma bloc de l'évolution globale

Les blocs A_i , i de 1 à n , sont les blocs correspondant aux évolutions internes dans un milieu. L'étude de ces blocs a fait l'objet de la première partie de cet article. Il faut noter que chaque bloc traite plusieurs entrées et sorties, correspondant aux différentes populations existantes dans le milieu.

Le bloc M modélise dans le cas présent les échanges entre les différents milieux. Il est donc appliqué à chaque pas après les évolutions internes.

Références

- [1] Center for disease control and prevention,
Transmission of smallpox,
<https://www.cdc.gov/smallpox/clinicians/transmission.html>,
Décembre 2016
- [2] Hans Nesse,
Global health - SIR model,
<http://www.public.asu.edu/~hnesse/classes/sir.html>
- [3] Ruprecht Schmidt-Ott, Markus Schwehm and Martin Eichner,
Influence of social contact patterns and demographic factors on influenza simulation results,
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5100331/>,
Novembre 2016
- [4] Hao Hu, Karima Nigmatulina and Philip Eckhoff,
The scaling of contact rates with population density for the infectious disease models,
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025556413001235>